

Le Vertige Paroxystique Positionnel Bénin

Comment optimiser sa démarche diagnostique ?



Numéro d'action : 99R72325002



Durée : 3 heures



Vous payez : 0 € (prise en charge DPC)



Vos indemnités : 22,50 €/heure

[Inscription](#)

CONTEXTE

Le **vertige paroxystique positionnel bénin (VPPB)** est une pathologie extrêmement **banale**.

Il représente **24,1 % des consultations** pour vertiges aux urgences et un 1/3 des consultations chez un ORL.

Cette pathologie spontanément **résolutive mais récidivante** ne devrait pas nécessiter une autre consultation que celle du **médecin référent**, tellement, une fois les connaissances nécessaires acquises, sa prise en charge est simple et codifiée.

Notre enseignement **pratico-pratique et commenté en vidéo** permet, aux **médecins généralistes**, de recueillir tous les **éléments cliniques pertinents** (interrogatoire, examen et manœuvres) pour **classer un vertige**.

Avec pour objectif principal d'optimiser la **démarche diagnostique et la prise en charge** des patients en cabinet.

+ VIDÉO/PODCAST

Un parcours en e-learning commenté par le **Pr Darrouzet** : Responsable du Service ORL, Chirurgie cervico-faciale et ORL pédiatrique du CHU de Bordeaux

+ DÉROULÉ

- **QCM** initial et final
- **12 modules vidéos commentés**: photos, tableau de classification, radios, **4 vidéos de manoeuvre**
- **18 QCM** inter-modules

OBJECTIFS

- Se familiariser aux VPPB : diagnostic, épidémiologie et facteurs de risques
- Comprendre l'origine des VPPBS : les bases anatomiques et physiologiques du vestibule
- Connaître l'implication des canalolithiases et cupulolithiases dans les VPPBs
- Diagnostiquer :
 - un VPPB causé par une canalolithiase du canal postérieur
 - un VPPB causé par une canalolithiase du canal latéral
 - un VPPB causé par une cupulolithiase du canal latéral
 - un VPC